



# OLKA RADZI:

PARTNER

**Espumisan**<sup>®</sup>  
Simeticonum

## Umiejętności związane z przyjmowaniem pokarmu u dzieci w 1 roku życia

### 1-4 miesiąc życia



ssanie



połykanie

### 5-6 miesiąc życia



początkowe rozdrabnianie pokarmów językiem



silny odruch ssania



wypychanie jedzenia z ust za pomocą języka (reakcja przejściowa)



otwieranie ust przy zbliżaniu łyżeczki

### 7-12 miesiąc życia



pobieranie wargami pokarmu z łyżeczki



gryzienie, żucie, ruchy języka na boki



rozwój umiejętności i koordynacji umożliwiających samodzielne jedzenie

### WAŻNE DLA RODZICÓW:

Rodzic lub opiekun decyduje, **CO** dziecko zje oraz **KIEDY** i **JAK** jedzenie będzie podane. Dziecko decyduje, **CZY** zje posiłek i **ILE** zje.

Na podstawie: Szajewska H i wsp. Standardy Medyczne/PEDIATRIA 2016;13:9-24

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Espumisan 100 mg/ml, krople doustne, emulsja SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 ml zawiera 100 mg symetykonu (Simeticonum). Pełny wykaz substancji pomocniczych w pkt. 6.1 Charakterystyki produktu leczniczego. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Krople doustne, emulsja. Mlecznobiała emulsja, o małej lepkości. Charakterystyczne dla tego produktu jest stopniowe żółknięcie emulsji. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Bez konsultacji z lekarzem: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym. Po konsultacji z lekarzem: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym w okresie pooperacyjnym; pomocniczo w badaniach diagnostycznych jamy brzusznej (np. w celu redukcji cieni wywołanych gazami w badaniach radiologicznych, ultrasonograficznych; badania endoskopowe; jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego). Espumisan 100 mg/ml wskazany jest do stosowania u niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Glienicke Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy Data ostatniej aktualizacji: 06.2020. Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Stomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00

Przygotowano: 07.2022, PL-ESP-2022-C2-11-v1-WEB

**BERLIN-CHEMIE**  
MENARINI

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.