



OLKA RADZI:

SPONSOREM JEST
DYSTRYBUTOR LEKU

Espumisan[®]
Simeticonum

Objawy kolki niemowlęcej

Kolka niemowlęca to jeden z najczęściej występujących problemów z przewodem pokarmowym, jaki obserwuje się u maluchów, występuje pomiędzy 2 tygodniem, a 4 miesiącem życia u ok 40% niemowląt.

Jakie są objawy kolki niemowlęcej?



zaczerwienienie
twarzy



podkurczanie
nózek



wzdęty brzuch



napady krzyku
lub płaczu, zwłaszcza
wieczorem

Kolka jelitowa zwykle ustępuje samoistnie w 3.-4. miesiącu życia. Jednak u około 7% dzieci dolegliwości mogą utrzymywać się do 9. miesiąca życia.

Na podstawie: 1. Lewandowska A., Zych E., Kolka jelitowa u noworodków – częstość występowania oraz metody postępowania przez rodziców, Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(6):65.
2. Rurarz A., Ratajczak K., Feleszko W., Kolki niemowlęce, Pediatr Med Rodz 2016, 12 (4), p. 413-415.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Espumisan 100 mg/ml, krople doustne, emulsja SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 ml zawiera 100 mg symetykonu (Simeticonum). Pełny wykaz substancji pomocniczych w pkt. 6.1 Charakterystyki produktu leczniczego. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Krople doustne, emulsja. Mlecznobiąta emulsja, o małej lepkości. Charakterystyczne dla tego produktu jest stopniowe żółknięcie emulsji. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Bez konsultacji z lekarzem: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym. Po konsultacji z lekarzem: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym w okresie pooperacyjnym; pomocniczo w badaniach diagnostycznych jamy brzusznej (np. w celu redukcji cieni wywołanych gazami w badaniach radiologicznych, ultrasonograficznych; badania endoskopowe; jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego). Espumisan 100 mg/ml wskazany jest do stosowania u niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy Data ostatniej aktualizacji: 06.2020.
Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul.Ślomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00

Przygotowano: 09.2022, PL-ESP-2022-C3-8-v1-WEB

BERLIN-CHEMIE
MENARINI

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.