

Espumisan® 100mg/ml



wysoka zawartość symetykonu*, który szybko rozbija pęcherzyki gazu



nie wchłania się do organizmu



nie zawiera cukru i benzoesauwów



ULGA

SPOKOJNE DZIECKO, SPOKOJNA MAMA

* minimalna, pojedyncza dawka zawiera 20 mg symetykonu.

Na podstawie: ChPL Espumisan® 100 mg/ml (11.2016).

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.


Espumisan® 100mg/ml

SPOKOJNE DZIECKO, SPOKOJNA MAMA



Kojące dźwięki dla maluszka

**DARMOWA
APLIKACJA**



Pobierz aplikację
używając kodu QR



Uspokajające dźwięki,
odgłosy natury
i kołysanki



Funkcja minutnika
kontrolująca
czas odtwarzania



Uruchomienie
w trybie samolotowym
nie powoduje
zakłóceń fal radiowych



Aplikacja dostępna dla
użytkowników urządzeń
mobilnych z systemami
Android lub iOS



NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Espumisan 100 mg/ml, krople doustne, emulsja **SKŁAD JAKOŚCIOWY I IŁOŚCIOWY:** 1 ml zawiera 100 mg symetykonu (*Simeticonium*). Pełny wykaz substancji pomocniczych w pkt. 6.1 Charakterystyki produktu leczniczego. **POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:** Krople doustne, emulsja. Mlecznobiała emulsja, o małej lepkości. Charakterystyczne dla tego produktu jest stopniowe żółknięcie emulsji. **WSKAZANIA DO STOSOWANIA:** Bez konsultacji z lekarzem: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym. *Po konsultacji z lekarzem:* leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym w okresie pooperacyjnym; pomocniczo w badaniach diagnostycznych jamy brzusznej (np. w celu redukcji cieni wywołanych gazami w badaniach radiologicznych, ultrasonograficznych; badania endoskopowe; jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego). Espumisan 100 mg/ml wskazany jest do stosowania u niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych. **PRZECIWSKAZANIA:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:** BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy **Data ostatniej aktualizacji:** 06.2020. Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00